

Beclomet Easyhaler 0,1 mg/Dosis Pulver zur Inhalation. **Beclomet Easyhaler 0,2 mg/Dosis** Pulver zur Inhalation. **Beclomet Easyhaler 0,4 mg/Dosis** Pulver zur Inhalation. **Wirkstoff:** Beclometasondipropionat. **Zusammensetzung:** Eine Einzeldosis enthält 0,1 mg/0,2 mg/0,4 mg Beclometasondipropionat. Sonstiger Bestandteil: Lactose-Monohydrat. **Anwendungsgebiete:** Behandlung von leichtem, mittelschwerem und schwerem persistierendem Asthma. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegenüber Beclometasondipropionat oder Milchprotein (Lactose). **Warnhinweise:** Enthält Lactose-Monohydrat. Gebrauchsinformation beachten! **Nebenwirkungen:** *Selten:* Bronchospasmus. *Häufig:* Candidose von Mund und Rachen, Heiserkeit, Husten, Entzündung im Hals, Halsschmerzen. *Nebenwirkungen mit nicht bekannter Häufigkeit:* Allergische Reaktionen (einschließlich anaphylaktischer Schock, Urtikaria, Hautausschlag, Angioödem), Nebennierensuppression, Wachstumsverzögerung bei Kindern und Jugendlichen, Cushing-Syndrom, cushingoide Merkmale, psychomotorische Überaktivität, Schlafstörungen, Angst, Depression, Aggression, Verhaltensänderungen (vorwiegend bei Kindern), Katarakt, Glaukom, verschwommenes Sehen, eosinophile Pneumonie, Anfälligkeit für blaue Flecken, Dünnerwerden der Haut, Abnahme der Knochendichte. Systemische Effekte inhalativer Kortikosteroide können auftreten, insbesondere bei hohen Dosen, die für längere Zeit verschrieben werden. **Verschreibungspflichtig. Stand der Information:** April 2017.

Zulassungsinhaber: Orion Corporation, Orionintie 1, FI-02200 Espoo. **Mitvertrieb:** Orion Pharma GmbH, Jürgen-Töpfer-Straße 46, 22763 Hamburg.

